

NEOPLASTİK HASTALARDA RADYODERMATİT: TEDAVİ PROTOKOLÜ



Vulnera, İtalyan Vulnolojik
Merkezi Turin - İtalya


R.Cassino, O.Forma, U.Cazzarò, T.Gaiani, AM.Ippolito

AMAÇ: radyoterapi, cildin sklerozunu veren, kalın, elastik ve hipohidratlı görünen çok önemli deri lezyonlarına neden olabilir; bu çalışmanın amacı, radiodermatit tedavisi için olan özel ürün etkinliğini göstermektir.


YÖNTEM: Çalışmada, radiodermatitli 20 hasta yer almıştır. Günlük olarak uygulanan hyaluronik asit jeli içinde, süspansiyon halinde tutulan fosfolipid bazlı bir vesiküler sistemini kullandık. Kızarıklığın kaybolma zamanını ve tedavinin ağrıya etkinliğini değerlendirdik (ağrı değerlendirmesi için, Sayısal Değerlendirme Ölçeği kullanıldı). Ayrıca, analjezik ilaçların kullanımındaki olası düşüşü de inceledik. Çalışma süresi, sonuca ulaşılarak belirlenmiş olup, her halükarda değerlendirme süresi, 3 haftadan fazla olmamalıdır.

SONUÇ: Tedavi edilen tüm hastalarda, tedaviden üç hafta sonra kızarıklık azalması/kaybolması olmuştur; ağrı kontrolündeki etki, tedavinin ilk haftasında semptomlarda belirgin azalma şeklinde tarif edilebilir. Çoğu durumda, analjezik ilaçların kullanımında önemli bir azalma olmuştur.

Use of Analgesic Drugs - First Week



Use of Analgesic Drugs - Third Week



Sakrum Radyodermatit



1 hafta sonra



3 haftalık tedaviden sonra




Meme
Radyodermatiti

Ağrı (10 - NRS)



Yara çevresi cilt
lezyonu yok

3 hafta içinde ağrının (0
- NRS) tamamen
yok olması



Boyun
radyodermatiti

Deri lezyonu,
Ağır eksüda
Enfeksiyon
riski, Ağrı (10 -
NRS)

3 haftalık tedaviden
sonra tam çözüm



KANI: Bu yeni protokolün radyodermatit ve özellikle ağrı üzerine etkinliği, ağrı kontrolünde en iyi sonucu elde etmek için, jelin günlük olarak etkilenen alanın tamamına uygulanmasını sağlayan bir tedavi protokolü oluşturmamıza neden oldu. Bu ürün güvenli kabul edilebilir çünkü, tüm hastalarda bu tedavi rahatlık sağladı ve alerjik reaksiyonlar tespit edilmedi ve uygulamada ağrı oluşturmadi.

ENDİKASYON DIŞI



Memenin yumuşatılmış eritemi - 6 günlük tedaviden sonra



*Jalosome (WeCare Industries)

Lipozomlar (taşıyıcı)
LMW Hyaluronik Asit
N-asetilkarnitin
Allantoin

ENDİKASYON DIŞI



kısığın yumuşatılmış eritem - 5 günlük tedaviden sonra



Centro Vulnologico
Italiano Torino

